

ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЕЗА

Педикулез или вшивость - заразное заболевание, вызываемое специфическим паразитированием на человеке вшей - мелких кровососущих, бескрылых насекомых, питающихся кровью. Все вши узко специфичны, на человеке паразитируют три вида вшей: головная, платяная и лобковая.

ПРОФИЛАКТИКА

Для предупреждения заражения вшами избегать контакта с зараженными педикулезом людьми и соблюдать правила личной гигиены, проводить регулярную уборку жилых помещений

При головном педикулезе при обнаружении небольшого количества головных вшей (от 1 до 5 насекомых), еще не успевших отложить яйца (гиды), можно использовать частый гребень для вычесывания вшей из волос; при незначительном количестве платяных вшей - белье можно прокипятить, а верхнюю одежду особенно швы и складки прогладить горячим утюгом

В тех случаях, когда насекомые уже отложили яйца, рекомендуется применять специальные инсектицидные средства - педикулициды, предназначенные для уничтожения вшей

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

Не разрешайте ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос, так как через эти предметы передаются вши

Проводите взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия. Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения

Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий

После каникул и пребывания детей в оздоровительных учреждениях будьте особенно бдительными: проведите осмотр головы ребенка

МЕРЫ БОРЬБЫ С ПЕДИКУЛЕЗОМ

Приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза с учетом возраста ребенка

На диметиконе - с 3 лет, бензилбензоате, эфирных и минеральных маслах - с 5 лет
Обработать волосистую часть головы средством в соответствии с прилагаемой инструкцией

После этого вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла; удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид

Надеть ребенку чистое белье и одежду

Постирать постельное белье и одежду, прогладить горячим утюгом с паром

Осмотреть всех членов семьи и себя на присутствие вшей

Повторить осмотр ребенка и членов семьи в течении месяца через каждые 7-10 дней

